

Angin-Heel® -

Tabletten

Z.Nr.

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Hydrargyrum bichloratum D8 30 mg; Phytolacca americana D4 30 mg; Apis mellifica D4 30 mg; Arnica montana D4 30 mg; Hepar sulfuris D6 60 mg; Solanum dulcamara D4 60 mg; Atropa belladonna D4 60 mg.

Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat, Lactose.

Arzneiform: Tabletten

Homöopathische Arzneispezialität

Packungsgrößen: 50 Stück

Pharmazeutisch-therapeutische Kategorie und Wirkungsweise:

Durch die Gabe homöopathischer Arzneimittel soll der Organismus zur Normalisierung körpereigener Vorgänge angeregt werden.

Angin-Heel-Tabletten ist ein homöopathisches Kombinationsarzneimittel. Solche Arzneimittel setzen sich aus verschiedenen homöopathischen Einzelmitteln zusammen, deren Arzneimittelbilder sich ergänzen. Daher können homöopathische Kombinationsarzneimittel nach klinischen Anwendungsgebieten angewendet werden.

Zulassungsinhaber und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH,
Baden-Baden, Deutschland

Vertrieb in Österreich:

Dr. Peithner KG nunmehr GmbH & Co, Wien

Anwendungsgebiete:

Zur Anregung der Selbstheilungstendenz bei akuter und chronischer Mandelentzündung.

Gegenanzeigen:

Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile des Präparates.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden
- Allergien haben oder
- andere Medikamente (auch selbstgekaufte!) anwenden.

-Heel



Schwangerschaft und Stillperiode:

Über die Einnahme während der Schwangerschaft und Stillperiode entscheidet der Arzt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung und besondere Warnhinweise:



Bei längerer Anwendung homöopathischer Arzneimittel sollte ein homöopathisch erfahrener Arzt hinzugezogen werden.

Bitte melden Sie Ihrem Arzt jede unerwünschte Reaktion und informieren Sie ihn auch über das Eintreten einer Schwangerschaft.

Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich.

Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Wechselwirkungen: Keine bekannt.

Dosierung:

Ändern Sie nicht von sich aus die Dosierung und hören Sie nicht plötzlich mit der Anwendung des Medikaments auf. Wenn Sie glauben, das Medikament wirke zu stark oder zu schwach, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Üblicherweise: 3 x 1 Tablette.

Im Akutzustand: alle 15 Minuten 1 Tablette (über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden).

Tabletten langsam unter der Zunge zergehen lassen. Die Einnahme erfolgt vor den Mahlzeiten.

Bei Nachlassen der Beschwerden seltener einnehmen.

Nebenwirkungen:

Nach Einnahme kann Speichelfluss auftreten; das Arzneimittel ist dann abzusetzen.

Teilen Sie Ihrem Arzt oder Apotheker jede unerwünschte Nebenwirkung mit.

Hinweis auf Verfalldatum und Lagerung: Verfalldatum beachten. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Haltbarkeit nach Öffnen des Behältnisses:

Die Haltbarkeit wird durch das Öffnen des Behältnisses nicht eingeschränkt, sofern nach sachgerechter Dosierung das Behältnis sofort wieder verschlossen wird.

Stand der Information: Oktober 2006

Bei Unklarheiten fachliche Beratung einholen.

