

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Eucarbon Tabletten

Wirkstoffe: Sennesblätter (Sennae folium), Trockenextrakt aus Rhabarberwurzel (Rhei radix), Holzkohle (Carbo ligni), gereinigter Schwefel (Sulfur depuratum)

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Eucarbon und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Eucarbon beachten?
3. Wie ist Eucarbon einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Eucarbon aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Eucarbon und wofür wird es angewendet?

Eucarbon enthält ausschließlich pflanzliche Wirkstoffe und wirkt darmregulierend und leicht abführend. Pflanzliche Kohle hat die Fähigkeit, diverse Stoffwechselprodukte zu binden, die durch die abführende Wirkung von Sennesblättern und Rhabarberwurzel ausgeschieden werden.

Eucarbon wirkt außerdem auch leicht desinfizierend im Verdauungstrakt.

Die leicht abführende Wirkung von Eucarbon setzt etwa 8 - 10 Stunden nach der Einnahme ein.

Anwendungsgebiete

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Behandlung von gelegentlich auftretender Verstopfung.

Dieses Arzneimittel ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich aufgrund langjähriger Verwendung für das genannte Anwendungsgebiet registriert ist.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Eucarbon wird angewendet bei Jugendlichen ab 12 Jahren und bei Erwachsenen.

2. Was sollten sie vor der Einnahme von Eucarbon beachten?

Eucarbon darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Sennesblätter, Rhabarberextrakt, Holzkohle, Schwefel oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- bei Darmverschluss oder bekannten Verengungen des Darms (Stenosen),
- bei Darmentzündungen, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa
- bei Bauchschmerzen unbekannter Ursache,
- bei schweren Störungen des Wasser- und Mineralhaushaltes,
- von Kindern unter 12 Jahren

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Eucarbon einnehmen.

Bestehen neben der Verstopfung unklare Bauchschmerzen, oder treten gar Übelkeit oder Erbrechen auf, dann ist die Ursache durch einen Arzt abzuklären, bevor Eucarbon eingenommen werden darf.

Bei regelmäßigem Bedarf an Abführmitteln ist die Ursache der Verstopfung durch einen Arzt abzuklären. Die Einnahme von Abführmitteln sollte generell nur erfolgen, wenn mittels Ernährungsumstellung kein ausreichender therapeutischer Effekt erzielt werden kann.

Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion sollten vor der Einnahme von Eucarbon einen Arzt fragen, da es vermehrt zu Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes kommen kann.

Die für eine sichere Wirkung nötige Dosis kann individuell unterschiedlich sein. Nehmen Sie Eucarbon ohne ärztliche Anordnung nicht über einen längeren Zeitraum (nicht länger als 1-2 Wochen) und nur im Bedarfsfall und nicht regelmäßig ein.

Eucarbon ist als Abmagerungsmittel nicht geeignet.

Bei ununterbrochener Anwendung von länger als 14 Tagen kann eine Wirkungsverminderung auftreten.

Kinder

Darf nicht von Kindern unter 12 Jahren eingenommen werden.

Einnahme von Eucarbon zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/ anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Wechselwirkungen können vor allem mit bestimmten Herzmedikamenten und Medikamenten auftreten, welche den Wasser- und Elektrolythaushalt beeinflussen, wie Kortison, entwässernde Mittel oder Süßholzwurzel.

Einnahme von Eucarbon zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Eucarbon kann zu oder nach den Mahlzeiten eingenommen werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Eine Einnahme von Eucarbon während der Schwangerschaft und Stillzeit wird nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Eucarbon hat keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Eucarbon enthält Saccharose und Milchzucker

1 Tablette enthält 43,4 mg Zucker (Saccharose) und 0,25 – 11,25 mg Milchzucker (Laktose). Bitte nehmen Sie Eucarbon erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

3. Wie ist Eucarbon einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

1 – 2 Tabletten bis zu 3mal täglich zur Erzielung einer milden abführenden Wirkung. Die für eine sichere Wirkung nötige Dosis kann individuell unterschiedlich sein. Ist ein stärkerer abführender Effekt erwünscht, kann die abendliche Dosis auf 3 - 4 Tabletten erhöht werden. Sie sollten eine maximale Dosis von 8 Tabletten täglich nicht überschreiten. Das Auftreten von Durchfall ist erstes Anzeichen für eine zu hohe Dosierung. In diesem Fall ist die Dosis herabzusetzen oder die Einnahme abubrechen.

Anwendung bei Kindern

Eucarbon Tabletten sind nicht für Kinder unter 12 Jahren bestimmt.

Eucarbon Tabletten sollen mit reichlich Flüssigkeit (mindestens ein Glas Wasser) zu oder nach den Mahlzeiten eingenommen werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Eucarbon eingenommen haben, als Sie sollten

Kann es zu Durchfällen kommen. Missbräuchliche Anwendung (Überdosierung oder langfristige Anwendung) kann zu schweren Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes führen. Bei chronischem Missbrauch kann es zum Auftreten von Leberschäden kommen.

Wenn Sie die Einnahme von Eucarbon vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Eucarbon Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Beobachtet wurden vereinzelt Bauchschmerzen, Durchfall, vor allem bei Patienten mit Reizdarmsyndrom oder bei Einnahme zu hoher Dosen. Sehr selten (bei weniger als 1 Person von 10.000) können Übelkeit oder Erbrechen auftreten.

Selten können allergische Reaktionen auftreten.

Wie auch bei anderen Abführmitteln kann die Einnahme von hohen Dosen über lange Zeit zu Mineralstoffverlusten, insbesondere Kalium-Verlusten führen, die eine Darmträgheit verstärken können. Dies kann sich in Muskelschwäche und eine durch eingeschränkte Darmtätigkeit bedingte Verstopfung äußern.

Eine schwache Rottfärbung des Harnes ist ohne Bedeutung und kann gelegentlich bei dessen alkalischer Reaktion beobachtet werden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Eucarbon aufzubewahren?

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und Blister nach „verw.bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Weitere Informationen

Was Eucarbon enthält

Die Wirkstoffe in 1 Tablette sind:

Sennesblätter (Sennae folium) 105 mg

Eingestellter Rhabarberwurzelextrakt (Extractum Rhei) 25 mg bestehend aus Trockenextrakt aus Rhabarberwurzel (Rhei radix) (Auszugsmittel Ethanol 70% V/V) 13,75 – 24,75 mg und 0,25 – 11,25 mg Lactose-Monohydrat

Holzkohle (Carbo ligni) 180 mg

Gereinigter Schwefel (Sulfur depuratum) 50 mg
Standardisierter Gesamtanthrachinongehalt von 2,65-3,95 mg (berechnet als Rhein)
Die sonstigen Bestandteile sind:
Pfefferminzöl, Bitterfenchelöl, Saccharose, Milchzucker (Lactose-Monohydrat),
Maisstärke, Arabisches Gummi, schweres Kaolin, Talk

Wie Eucarbon aussieht und Inhalt der Packung

Grauschwarze, zylindrische, beidseitig nach außen gewölbte Tabletten in Packungen zu 10, 30, 50, 100 und 500 Stück.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

F.Trenka chem.- pharm. Fabrik GmbH,
Prinz-Eugen-Straße 70
1040 Wien

Reg.Nr.: 735895

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2018