


Freigabe am: 19.06.2013
Dateiname: GI_Soventol Stiff
Art. Nr.:
Größe: 148 x 210 mm
Farben: Pantone 661 C
HKS 13
Pantone 291 C

GEBRAUCHSANWEISUNG – bitte aufmerksam lesen!

Soventol®

Stiff



Zusammensetzung

Alcohol denat., Menthol, Dexpanthenol, Aloe Barbadensis, Macrogollaurylether, Xanthangummi, Gereinigtes Wasser, Citronensäure, Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat.

Darreichungsform und Inhalt

1 Packung enthält 4 ml Gel.

Hersteller

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG,
Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn,
Telefon: 02371/937-0, Telefax: 02371/937-329,
E-Mail: info@medice.de, www.medice.de

Zweckbestimmung

Soventol® Stiff wird aufgrund des kühlenden Effektes zur lokalen Linderung von Juckreiz und Brennen, z. B. bei Insektenstichen und Sonnenbrand, angewendet.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Soventol® Stiff nicht anwenden?

Soventol® Stiff darf nicht angewendet werden:

- bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe
- auf verletzter Haut oder Wunden

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Soventol® Stiff darf bei Kindern nicht großflächig angewendet werden.

Bei Kindern unter 2 Jahren darf Soventol® Stiff nicht im Gesicht oder am Hals angewendet werden.

Nicht am oder in unmittelbarer Nähe vom Auge anwenden.

Bei versehentlichem Verschlucken der Verschlusskappe kann es zu Atemnot kommen. Suchen Sie in diesem Fall bitte sofort einen Arzt auf.



Wechselwirkungen

Welche anderen Medizinprodukte oder Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Soventol® Stiff oder werden in ihrer Wirkung beeinflusst?

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewendete Arzneimittel oder andere Medizinprodukte gelten können.

Die Freisetzung von Wirkstoffen aus anderen Hautpräparaten und deren Aufnahme in die Haut kann durch Soventol® Stiff verstärkt werden. Daher sollte Soventol® Stiff nicht mit anderen Hautpräparaten zusammen am gleichen Ort angewendet werden.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Wie und wie oft sollten Sie Soventol® Stiff verwenden?

Soventol® Stiff wird punktuell auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen. Durch seinen Kühleffekt lindert er schnell den Juckreiz. Sobald die Wirkung nachlässt, kann die Anwendung mehrmals täglich in gleicher Weise wiederholt werden. Gleichzeitig wird die beanspruchte und juckende Haut durch die spezielle Formel aus hochwertigen Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel Aloe Vera und Panthenol nachhaltig gepflegt und beruhigt.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Soventol® Stiff auftreten?

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung aufge-

führt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Apotheker oder dem Hersteller mit.

Soventol® Stiff ist im Allgemeinen gut verträglich. In seltenen Fällen kann es bei entsprechender Überempfindlichkeit zu Hautreaktionen kommen.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit und Aufbewahrung des Medizinproduktes

Soventol® Stiff soll außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden!

Bitte achten Sie darauf, dass der Stiff nach der Anwendung wieder gut verschlossen wird, um ein Austrocknen zu vermeiden.

Das Verfallsdatum ist auf dem Stiff sowie der Faltschachtel aufgedruckt.

Verwenden Sie bitte Soventol® Stiff nicht mehr nach diesem Datum!

Nach Anbruch ist Soventol® Stiff 6 Monate haltbar.

Stand der Information

Juni 2013

Erläuterung der Packungssymbole



Verwendbar bis



Chargennummer



Gebrauchsanweisung beachten



Medizinprodukt

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller



MEDICE Arzneimittel
Pütter GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37
D-58638 Iserlohn

Telefon: +49 (0) 2371 937-0
Telefax: +49 (0) 2371 937-329
E-Mail: info@medice.de
www.medice.de

www.soventol.de

