

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR ANWENDER

Chlorhexamed FORTE 0,2% - orale Spüllösung

Wirkstoff: Chlorhexidindigluconat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Zahnarztes an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Zahnarzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist *Chlorhexamed FORTE 0,2%* und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von *Chlorhexamed FORTE 0,2%* beachten?
3. Wie ist *Chlorhexamed FORTE 0,2%* anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist *Chlorhexamed forte 0,2%* aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist *Chlorhexamed FORTE 0,2%* und wofür wird es angewendet?

Chlorhexamed FORTE 0,2% ist ein oberflächenaktives Mund- und Rachen-Antiseptikum (Desinfektionsmittel) mit breitem Wirkungsspektrum und Langzeitwirkung gegen bakterielle Erreger und einer etwas schwächeren Aktivität gegen Pilzkrankungen.

Durch Spülungen oder Einsprühen mit *Chlorhexamed FORTE 0,2%* werden bakterielle Infektionen im Mund- und Rachenraum wirkungsvoll behandelt.

Chlorhexamed FORTE 0,2% dient der Behandlung und Vorbeugung bakterieller Infekte in Mund- und Rachenraum und ist angezeigt:

- zur Verminderung und Vorbeugung bakterieller Zahnbeläge (Zahnplaque);
- zur Behandlung einfacher bis eitriger Zahnfleischentzündungen (Gingivitis);
- zur Behandlung oder Vorbeugung infektiös bedingter Erkrankungen des Zahnbettes und deren Folgeerscheinungen (Parodontopathien);
- bei Mandelentzündungen (Tonsillitis), Angina, Seitenstrangangina, Rachenschleimhautentzündung (Pharyngitis);
- bei Verletzungen sowie vor und nach operativen Eingriffen im Mund- und Rachenraum (z. B. vor und nach Mandeloperationen sowie zahnchirurgischen Eingriffen), da *Chlorhexamed FORTE 0,2%* den Heilungsprozess unterstützt;
- bei Aphthen (schmerzhafte entzündete Stellen der Schleimhaut des Zahnfleisches, der Mundhöhle oder der Zunge) und Mundschleimhautentzündungen wie Stomatitis (unter Prothesen) und Glossitis. Bei schwerer Pilzkrankung der Mundschleimhaut (Soor) wird gelegentlich eine zusätzliche Therapie mit speziellen Mitteln gegen Pilzkrankungen erforderlich sein;
- zur Beseitigung von Mundgeruch, wenn eine normale Mundhygiene nicht möglich ist und der Mundgeruch nicht durch eine Magenerkrankung bedingt ist;
- zur Mundhygiene, wenn eine normale Mundhygiene (Zähneputzen) nicht möglich ist, z. B. bei schweren Allgemeinerkrankungen und Patienten in Intensivpflege.

Wenn Sie sich nach 3 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von *Chlorhexamed FORTE 0,2%* beachten?

***Chlorhexamed FORTE 0,2%* darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Chlorhexidindigluconat oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- bei offenen Wunden und Geschwüren in der Mundhöhle sowie bei oberflächlich nicht-blutender Abschuppung der Mundschleimhaut. ,
- bei Personen, die das Schlucken nicht richtig kontrollieren können (unter anderem Kinder unter 6 Jahren).
- bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren (Gefahr eines Kehlkopfkrampfes).
- bei Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Das Einatmen von *Chlorhexamed FORTE 0,2%* kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Zahnarzt oder Apotheker bevor Sie *Chlorhexamed FORTE 0,2%* anwenden.

Sie dürfen *Chlorhexamed FORTE 0,2%* nicht ins Auge, die Augenumgebung oder in den Gehörgang bringen. Bei versehentlichem Kontakt mit Auge oder Gehörgang muss mit reichlich Wasser ausgespült werden.

Chlorhexamed FORTE 0,2% soll nicht geschluckt werden.

Mundspülungen mit *Chlorhexamed FORTE 0,2%* ersetzen nicht das Zähneputzen.

Chlorhexamed FORTE 0,2% sollte ohne ärztliche Empfehlung nicht länger als 3 Wochen ohne Unterbrechung angewandt werden, da sich bei längerer Anwendungsdauer Verfärbungen der Zunge und der Zähne sowie Geschmacksstörungen einstellen können.

In besonderen Fällen, z. B. der Intensivpflege bei manuell Behinderten, kann eine vorbeugende Behandlung auch über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden.

Eventuelle Verfärbungen an Zähnen, Zunge, Füllungen und Zahnersatz können Sie weitgehend verhindern: Putzen Sie Ihre Zähne vor der Anwendung von *Chlorhexamed FORTE 0,2%* mit einer normalen Zahncreme. Reduzieren Sie gegebenenfalls Ihren Konsum von Tee, Kaffee und Rotwein. Zahnprothesen reinigen Sie mit einem handelsüblichen Prothesenreiniger ebenfalls vor der Anwendung von *Chlorhexamed FORTE 0,2%*. Dennoch auftretende Verfärbungen können durch intensives Putzen mit der Zeit wieder entfernt werden. In hartnäckigen Fällen durch professionelle Reinigung durch den Zahnarzt, bei Vollprothesen durch einen Spezialreiniger.

Patienten, die sich einer Alkoholentzugskur unterziehen, sollen das Verschlucken von *Chlorhexamed FORTE 0,2%* absolut vermeiden, da eine bis zur Markierungslinie gefüllte Dosierungskappe (10 ml) etwa 0,6 g Alkohol enthält.

Ständiges Spülen der Mundhöhle mit *Chlorhexamed FORTE 0,2%* ohne Zähneputzen kann Zahnfleischbluten fördern.

Bei Wundgefühl, einer Schwellung oder Reizung im Mund sollte die Behandlung abgebrochen und ein Arzt oder Apotheker konsultiert werden.

Anwendung von *Chlorhexamed FORTE 0,2%* zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt, Zahnarzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

Chlorhexamed FORTE 0,2% wird durch anionische Substanzen, die in der Regel ein Bestandteil üblicher Zahnpasten sind, in der Wirkung beeinträchtigt. Wenden Sie diese deshalb nicht gleichzeitig, sondern mindestens 5 Minuten **vor** der Mundspülung mit *Chlorhexamed FORTE 0,2%* an (Mund zwischen Zähneputzen und der Anwendung von *Chlorhexamed FORTE 0,2%* gründlich mit Wasser spülen).

Anwendung von *Chlorhexamed FORTE 0,2%* zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Essen oder trinken Sie unmittelbar nach der Anwendung von *Chlorhexamed FORTE 0,2%* keine zuckerhaltigen Speisen und Getränke, da *diese* sonst die Wirkung von *Chlorhexamed FORTE 0,2%* beeinträchtigen können.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt, Zahnarzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine ausreichenden Erfahrungen oder Untersuchungen zur Sicherheit einer Anwendung von *Chlorhexamed FORTE 0,2%* in der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Deshalb sollte *Chlorhexamed FORTE 0,2%* nur unter besonderer Vorsicht und nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Chlorhexamed FORTE 0,2% hat keinen oder lediglich vernachlässigbaren Einfluß auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

***Chlorhexamed FORTE 0,2%* enthält Macroglycerohydroxystearat, 7% Alkohol sowie Sorbitol.**

Der in *Chlorhexamed FORTE 0,2%* enthaltene Hilfsstoff Macroglycerohydroxystearat kann Hautreizungen hervorrufen.

Dieses Arzneimittel enthält 7% Alkohol. Patienten, die sich einer Alkoholentzugskur unterziehen, sollen das Verschlucken von *Chlorhexamed FORTE 0,2%* absolut vermeiden, da eine bis zur Markierungslinie gefüllte Dosierungskappe (10 ml) etwa 0,6 g Alkohol enthält. Vor allem bei Fehlanwendung (Verschlucken) kann der Alkoholgehalt ein gesundheitliches Risiko darstellen und ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko aufgrund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

Dieses Arzneimittel enthält Sorbitol. Bitte nehmen Sie *Chlorhexamed FORTE 0,2%* daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

3. Wie ist *Chlorhexamed FORTE 0,2%* anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt, Zahnarzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt, Zahnarzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Zahnarzt die Anwendung von *Chlorhexamed FORTE 0,2%* nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da *Chlorhexamed FORTE 0,2%* sonst nicht richtig wirken kann! Überschreiten sie nicht die angegebene Dosierung.

Kinder ab 6 Jahre und Jugendliche

Die Anwendung bei Kindern zwischen 6 und 12 Jahren soll nur auf Anweisung des Zahnarztes erfolgen. Spezielle Empfehlungen zur Dosierung bei Kindern ab 6 Jahren liegen nicht vor, die Dosierung wird vom Zahnarzt festgesetzt.

Falls vom Zahnarzt nicht anders verordnet, gilt für Jugendliche ab 12 Jahren die für Erwachsene angegebene Dosierung.

Kinder bis 6 Jahre

Die Anwendung und Sicherheit bei Kindern unter 6 Jahren ist bisher nicht geprüft worden. Aufgrund der Gefahr des versehentlichen Verschluckens sollen Kinder unter 6 Jahren *Chlorhexamed FORTE 0,2%* nicht anwenden.

Ältere Patienten \geq 65 Jahren

Spezielle Empfehlungen zur Dosierung bei älteren Patienten liegen nicht vor. Die normale für Erwachsene empfohlene Dosis gilt auch für diese Personengruppen, wenn Ihr Arzt oder Zahnarzt nichts anderes empfiehlt.

Wie oft und wann sollten Sie *Chlorhexamed FORTE 0,2%* anwenden?

Chlorhexamed FORTE 0,2% ist 2mal täglich anzuwenden, am besten morgens und abends nach den Mahlzeiten.

Wie sollten Sie *Chlorhexamed FORTE 0,2%* anwenden?

Zur Anwendung in der Mundhöhle. Unmittelbar **vor** der Anwendung von *Chlorhexamed FORTE 0,2%* sollten die Zähne geputzt und anschließend die Mundhöhle gründlich mit Wasser ausgespült werden (vergleiche Abschnitt: „Anwendung von *Chlorhexamed fort 0,2%* zusammen mit anderen Arzneimitteln“).

Spüllösung: Bei jeder Anwendung die Dosierungskappe bis zur Markierungslinie füllen (10 ml) und 1 Minute lang im Mund spülen (intensiv durch die Zahnzwischenräume ziehen) oder im Rachen gurgeln. Danach ausspucken – nicht schlucken oder nachspülen. Bei Entzündungen, hervorgerufen durch Zahnprothese, soll das Gebiss zweimal täglich nach der Reinigung für 15 Minuten in *Chlorhexamed FORTE 0,2%* eingelegt werden. Mund zusätzlich wie oben spülen.

Spray: Den Sprühkopf auf die Flasche schrauben. Danach zweimal täglich 12 Sprühstöße gleichmäßig auf die betroffenen Stellen (Zähne, Mundschleimhaut oder Wundbereiche) sprühen.

Besonders bei der Bekämpfung entzündlicher Parodontopathien (infektiös bedingter Erkrankungen des Zahnbettes) ist es wichtig, vor jeder Mundspülung oder jedem Einsprühen die Zähne gründlich zu reinigen, um eine bessere Haftung von *Chlorhexamed FORTE 0,2%* auf der Zahnoberfläche und damit eine wirksame Hemmung des Plaquewachstums zu gewährleisten.

Bei Intensivpflegefällen oder manuell behinderten Patienten, bei denen eine aktive Mundspülung nicht möglich ist, kann mit *Chlorhexamed FORTE 0,2%* mittels Pinselung die Plaquebeseitigung durchgeführt werden.

Die Lösung ist gebrauchsfertig und daher unverdünnt anzuwenden.

Wie lange sollen Sie *Chlorhexamed FORTE 0,2%* anwenden?

Führen Sie die Behandlung 3 Wochen lang in Verbindung mit mechanischen Reinigungsverfahren durch. Wenn sich die Entzündung nach dieser Zeit nicht gebessert hat, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen. In besonderen Fällen, z. B. bei Behinderten, kann eine vorbeugende Behandlung auch über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von *Chlorhexamed FORTE 0,2%* zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge von *Chlorhexamed FORTE 0,2%* angewendet haben, als Sie sollten

Sollten Sie eine größere Menge von *Chlorhexamed FORTE 0,2%* angewendet haben, spülen Sie Ihren Mund mit Wasser und spucken Sie dieses wieder aus. *Chlorhexamed FORTE 0,2%* soll nicht (in großen Mengen und absichtlich) geschluckt werden.

Der Wirkstoff Chlorhexidin wird nur in geringen Mengen vom Körper aufgenommen, Vergiftungserscheinungen sind nicht bekannt. Sollten trotzdem Beschwerden auftreten, suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf.

Hinweis für den Arzt bzw. das medizinische Fachpersonal

Informationen zur Überdosierung finden Sie am Ende der Gebrauchsinformation.

Wenn Sie die Anwendung von *Chlorhexamed FORTE 0,2%* vergessen haben

Versuchen Sie nicht die vergessene Anwendung nachzuholen oder wenden Sie nicht die doppelte Menge an, sondern setzen Sie die Behandlung entsprechend der Dosierungsanleitung fort.

Wenn Sie die Anwendung von *Chlorhexamed FORTE 0,2%* abbrechen

In diesem Fall sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Zahnarzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden üblicherweise folgende Häufigkeitsangaben zu Grunde gelegt:

<i>Sehr häufig:</i>	Bei mehr als 1 von 10 Behandelten
<i>Häufig:</i>	Bei mehr als 1 von 100 Behandelten
<i>Gelegentlich:</i>	Bei mehr als 1 von 1000 Behandelten
<i>Selten:</i>	Bei mehr als 1 von 10.000 Behandelten
<i>Sehr selten:</i>	Bei 1 oder weniger von 10.000 Behandelten
<i>Nicht bekannt:</i>	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Häufig: Beeinträchtigung des Geschmackempfindens und Taubheitsgefühl der Zunge, welches sich üblicherweise im Laufe der Anwendung von *Chlorhexamed FORTE 0,2%* verbessert. Sollten die Symptome nach Beendigung der Therapie weiter anhalten, sollte ein Arzt oder Apotheker hinzugezogen werden; vorübergehende Verfärbungen von Zahnhartgewebe, Restaurationen (z. B. Füllungen) und der Zungenpapillen

Gelegentlich: brennendes Gefühl auf der Zunge zu Beginn der Behandlung, welches sich üblicherweise im Laufe der Anwendung von *Chlorhexamed FORTE 0,2%* verbessert. Sollten die Symptome nach Beendigung der Therapie weiter anhalten, sollte ein Arzt oder Apotheker hinzugezogen werden

Selten: verstärkte Zahnsteinbildung, bestimmte vorübergehende Veränderungen der Mundschleimhaut (desquamative Veränderungen der Mukosa), vorübergehende Schwellung der Ohrspeicheldrüse, Sialadenose (Erkrankungen der Speicheldrüsen), Zahnfleischblutung, Überempfindlichkeitsreaktionen, allergische Reaktionen (u.a. Nesselausschlag, Rötung der Haut, Juckreiz)

Sehr selten: schwerer allergischer Schock.

Beenden Sie die Anwendung von *Chlorhexamed FORTE 0,2%* und wenden Sie sich an ihren Arzt oder Apotheker, wenn folgende Symptome auftreten: Ausschlag, Schwellungen der Lippen, Zunge, Hals oder Gesicht oder bei schwerer Atmung, da diese Symptome ein Anzeichen für eine schwerwiegende allergische Reaktion sein können.

Nicht bekannt: verzögerte Wundheilung. Das enthaltene Pfefferminzaroma kann bei Säuglingen und Kindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf auslösen, mit der Folge schwerer Atemstörungen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist *Chlorhexamed FORTE 0,2%* aufzubewahren?

Nicht über 25° C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach Anbruch 3 Monate haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was *Chlorhexamed FORTE 0,2%* enthält:

- Der Wirkstoff ist: Chlorhexidindigluconat
100 ml enthalten: 0,2 g Chlorhexidindigluconat
Eine Einzeldosis von 10 ml enthält 20 mg Chlorhexidindigluconat
- Die sonstigen Bestandteile sind: Ethanol, Macrogolglycerolhydroxystearat, Sorbitol (E420), gereinigtes Wasser, Pfefferminzaroma.

Wie *Chlorhexamed FORTE 0,2%* aussieht und Inhalt der Packung:

Lösung bzw. Spray zur Anwendung in der Mundhöhle.

Klare, farblose Lösung

Chlorhexamed FORTE 0,2% ist in Packungen zu

1 Flasche, Braunglas, mit Dosierungskappe mit 200 ml Lösung und
1 Flasche, Braunglas, mit Verschlusskappe und Sprühkopf mit 50 ml Lösung
erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

Bußmatten 1

77185 Bühl

Deutschland

Tel.: +49 (0) 7223/76-0

Fax: +49 (0) 7223/76-4000

Falls weitere Informationen über das Arzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des Pharmazeutischen Unternehmers in Verbindung.

Z.Nr.: 17.866

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im November 2013.

Die folgenden Informationen sind für medizinisches Fachpersonal bestimmt:

Überdosierung


Chlorhexamed FORTE 0,2% soll nicht (in großen Mengen und absichtlich) geschluckt werden. Der Wirkstoff Chlorhexidin wird nach oraler Aufnahme nur in vernachlässigbar geringen Mengen resorbiert. Dennoch sollte eine Magenspülung durchgeführt werden.

Aufgrund des Alkoholgehaltes kann das Verschlucken von größeren Mengen vor allem bei Kleinkindern zu einer Alkoholvergiftung und zu Störungen des Magen-Darmtrakts (inkl. Nausea) führen.

HINWEIS ZUR HANDHABUNG DER SPRÜHVORRICHTUNG

Nach Aufschrauben des Schraubkappenverschlusses wird die Pumpvorrichtung auf die Flasche aufgesetzt und fest verschraubt. Der Adapter wird auf die Pumpvorrichtung aufgesetzt und aufgedrückt, dabei nicht verkanten. Bei Gebrauch die Flasche senkrecht halten.

Vor der ersten Anwendung einige Male die Pumpe betätigen, um Luft aus der Pumpvorrichtung zu entfernen. Zur Anwendung wird das Sprührrohr in den Mund an die zu behandelnden Stellen eingeführt und der Sprühkopf heruntergedrückt.



Schraubkappenverschluss aufschrauben, Flasche öffnen.

Pumpvorrichtung in die Flasche einführen.

Flasche wieder fest verschließen.

Nun Pumpkopf auf den freiliegenden Teil der Pumpvorrichtung aufsetzen und festdrücken. Vorsicht: Nicht verkanten!

Bei Gebrauch Flasche stets aufrecht halten.

Sprührrohr in den Mund einführen, Sprühkopf zum Sprühen herunterdrücken.

Sprühkopf und Adapter sind nicht zur Wiederverwendung bestimmt. Nach Aufbrauchen des Flascheninhaltes bitte entsorgen.