

## **Utipro® plus**

### **Anwendungsbereich**

Das Medizinprodukt wird angewendet zur Kontrolle und Vorbeugung von Harnwegsinfekten, die durch Krankheitserreger wie E. coli und andere für gewöhnlich an der Entstehung von urologischen Infektionen beteiligte gramnegative Bakterien verursacht wurden.

Das Präparat aus Gelatine und Xyloglucan (Hemicellulose) wirkt mechanisch im Inneren des Darmes, indem der Kontakt der Krankheitserreger mit der Darmschleimhaut unterbunden wird. Dieser Kontakt ist der erste Schritt zu ihrer Verbreitung und ihrem anschließenden Eindringen in die Harnwege.

Das Medizinprodukt wird ab dem Auftreten der ersten Symptome von Harnwegserkrankungen oral eingenommen, mit dem Ziel, die Vermehrung der Krankheitserreger zu vermindern, die zu Infektionen führen könnten. Bei wiederkehrenden Infektionen wird das Produkt auch zur Vorbeugung von Rückfällen angewendet, bei denen die Vermehrung von Krankheitserregern zu wiederholten Harnwegsinfekten führt.

### **Packung**

Das Medizinprodukt liegt in Kapselform in einer Blisterpackung vor.

### **Zusammensetzung**

Kombination aus Gelatine und Xyloglucan (Hemicellulose), Propolis, Hibiscus sabdariffa, Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Maisstärke.

### **Dosierung**

Bei Auftreten der ersten Symptome von Harnwegsbeschwerden nehmen die Patienten täglich 2 Kapseln über 5 Tage ein. Zur Vorbeugung von wiederkehrenden Infekten wird täglich 1 Kapsel über mindestens 15 aufeinanderfolgende Tage pro Monat eingenommen (gegebenenfalls kann das Produkt über mehrere Zyklen eingenommen werden).

### **Anwendungshinweis**

Die Kapsel mit Wasser schlucken.

### **Warnhinweise**

- Die Diagnose eines Harnwegsinfekts muss durch medizinisches Fachpersonal erfolgen. In folgenden Fällen empfiehlt es sich, einen Arzt zu Rate zu ziehen: bei zweifelhafter Diagnose, schwerwiegenden Symptomen wie hohem Fieber, Alter unter 14 Jahren und Vorliegen anderer Erkrankungen oder Risikofaktoren.
- Ein akuter Harnwegsinfekt kann eine antibiotische Behandlung erforderlich machen. Dieses Medizinprodukt ist kein Antibiotikum und hat keine bakterizide oder bakterienhemmende Wirkung gegenüber den Krankheitserregern, daher kann es keine antibiotische Behandlung ersetzen, wenn diese vom medizinischen Fachpersonal angeraten wird. Ist eine Behandlung mit einem Antibiotikum erforderlich, kann dieses Produkt gleichzeitig dazu verabreicht werden.
- Obwohl keine Nebenwirkungen bekannt sind, sollte dieses Produkt nicht in den ersten Monaten der Schwangerschaft oder während der Stillzeit angewendet werden. In diesen Fällen ist zunächst ein Arzt zu Rate zu ziehen.
- Medizinprodukt nach dem auf der Packung aufgedruckten Verfalldatum nicht mehr verwenden.
- Kapseln nicht einnehmen, wenn die Blisterpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- Bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort abseits von Wärmequellen lagern.
- Nicht einfrieren.
- Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### **Gegenanzeigen und Nebenwirkungen**

Das Produkt darf nicht bei Patienten angewendet werden, bei denen eine Überempfindlichkeit gegen Gelatine oder einen der Bestandteile des Medizinprodukts bekannt ist.

Rev: 02a01 dated 21.03.2014

Vertrieb: Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H.  
Salzbergstraße 96, 6067 Absam (Österreich)